КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЭКЗАМЕН 2002 г.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 (800 б.)

1. (120 б.) Для невозбужденного состояния иона Mo^{+5} написать электронную конфигурацию и привести возможные значения квантовых чисел для АО, на которых может находиться валентный электрон.
2. (140 б.) Изобразить энергетические диаграммы МО для NO, NO^+ и NO^- . Можно ли отличить эти частицы методом ИК-спектроскопии? Ответ обосновать.
3. (150 б.) Определить пространственное строение следующих частиц: SeF_2Cl_2 , SeO_3^{2-} , XeO_3 .
Какие из молекул обладают постоянным дипольным моментом? Ответ обосновать.
4. (120 б.) Могут ли образоваться электронно-возбужденные частицы в реакции: $\text{Li}^{2+} + \text{Be}^{4+} = \text{Li}^{3+} + \text{Be}^{3+}$?
5. (120 б.) Потенциалы ионизации атома и молекулы кислорода равны 1314 и 1165 кДж/моль соответственно. Определить, какая из реакций $\text{O}_3^+ = \text{O}_2^+ + \text{O}$ или $\text{O}_3^+ = \text{O}_2 + \text{O}^+$ является энергетически более выгодной и насколько.
Изобразить энергетическую диаграмму системы.
6. (150 б.) Для изобарного нагревания 1 моля газа X от 600 до 601 К требуется теплота в количестве 20,775 Дж. Определить,
а) является ли газ двух- или одноатомным;
б) изменение энтропии при изохорном охлаждении 1 моля газа X от 600 до 300 К.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 (400 б.)

1. (60 б.) Константа равновесия реакции увеличивается в ϵ раз при увеличении температуры от 400 до 500 К. Определить температуру, при которой константа равновесия реакции будет в ϵ раз меньше, чем при 400 К. В расчетах принять, что $\Delta_r C_p^0 = 0$; ϵ – основание натурального логарифма.
2. (100 б.) К 1 л $2 \cdot 10^{-3}$ М раствора AgNO_3 добавили 1 л $4 \cdot 10^{-3}$ М раствора HCl . Определить осмотическое давление, pH и концентрации ионов Ag^+ и Cl^- в полученном растворе.
 $K_L(\text{AgCl}) = 1,7 \cdot 10^{-10}$.

3. (60 б.) Показать, что условие осаждения труднорастворимого гидроксида $\text{Me}(\text{OH})_y$ определяется уравнением:

$$pH > -\lg K_w + \frac{1}{y} \lg K_L - \frac{1}{y} \lg [\text{Me}^{y+}],$$

где K_w и K_L – ионное произведение воды и произведение растворимости гидроксида соответственно.

3. (80 б.) В 1 л ацетатного буферного раствора состава $[\text{OAc}^-] = [\text{HOAc}] = 10^{-2}$ моль/л добавили 10^{-4} моля кислоты HX . Степень диссоциации кислоты HX в этом растворе составила 0,1. Определить константу гидролиза кислотного остатка X^- .
 $K_a(\text{HOAc}) = 10^{-5}$.
5. (100 б.) При 1000°C и общем давлении 20 атм в равновесной смеси $\text{CO}_2(\text{г}) + \text{C}(\text{тв}) = 2\text{CO}(\text{г})$ содержится 12,5 % об. CO_2 . Определить:
 - а) константу равновесия реакции;
 - б) направление реакции и равновесный состав при общем начальном давлении 30 атм и начальном содержании в смеси: 5 молей $\text{C}(\text{тв})$, 1 моль CO_2 и 2 моля CO .

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 (800 б.)

- (140 б.) Стандартная энтропия графита при 298 К $S_{298}^0 = 5,74$, а при 398 К $S_{398}^0 = 8,21$ Дж/моль·К. Определить:
 - стандартную энтальпию образования графита при 398 К $\Delta H_{f,398}^0$;
 - количество теплоты, которое необходимо для нагревания 1 моля графита от 298 до 398 К при $p=1$ атм. Принять, что теплоемкость графита C_p^0 не зависит от температуры.
- (160 б.) Для реакции $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{тв}) + 4\text{H}_2(\text{г}) = 3\text{Fe}(\text{тв}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{г})$ константа равновесия $K_p = 16$. Найти равновесный состав реакционной смеси, если в предварительно вакуумированный сосуд поместили: а) 1 моль Fe_3O_4 и 3 моля H_2 ; б) 0,25 моля Fe_3O_4 и 3 моля H_2 .
- (180 б.) pH раствора, полученного добавлением $8 \cdot 10^{-3}$ моля КОН к 1 л 0,01 М раствора слабой кислоты HA , равен 7. Рассчитать:
 - K_a кислоты HA ;
 - осмотическое давление полученного раствора.
 $T = 298$ К.
- (180 б.) Гальванический элемент составлен из хлорсеребряного и каломельного электродов. Стандартный потенциал каломельного электрода больше хлорсеребряного на 0,046 В. Концентрация анионов Cl^- для каломельного электрода в 100 раз больше, чем для хлорсеребряного. Определить:
 - какой из электродов является катодом, а какой – анодом;
 - ЭДС элемента;
 - реакцию, протекающую в элементе.
 $T = 298$ К.
- (140 б.) При 500 К скорость обратимой элементарной газофазной реакции $A = B + C$ равна 10^{-5} моль/л·с при концентрациях $C(A) = 10^{-3}$ моль/л, $C(B) = 10^{-2}$ моль/л и $C(C) = 0$. Определить константы скорости прямой и обратной реакций k_f и k_r , если для этой реакции при 500 К $\Delta_r G_{500}^0 = -500R \cdot \ln 4,1$.

ЭКЗАМЕН (1500 б.)

- (200 б.) а) Чему равна ковалентность Se в основном и возбужденных состояниях? Написать электронные конфигурации этих состояний.
б) Предложить геометрическое строение фторидов селена (SeF_n), соответствующих разным значениям ковалентности атома Se. Какие из них и почему имеют постоянный дипольный момент?
- (150 б.) Изобразить энергетическую диаграмму МО для частицы BN. Определить кратность связи для частиц BN^- , BN и BN^+ .
- (150 б.) Рассчитать изменение энергии в реакции $\text{He}^+ + \text{H} = \text{He} + \text{H}^+$. В расчетах принять, что энергия межэлектронного отталкивания в атоме He равна 29,8 эВ.
- (150 б.) Рассчитать изменение энтальпии и энтропии при изобарном нагревании смеси газов, состоящей из 1 моля Ar и 1 моля O_2 , от 300 до 400 К.
- (250 б.) В вакуумированный сосуд помещен избыток твердого вещества AB_2 . При нагревании в системе устанавливается равновесие $AB_2(\text{тв}) = A(\text{г}) + 2B(\text{г})$.
При 300 К равновесное давление равно 0,3 атм, при 350 К – 0,6 атм. Найти:
а) энтальпию ($\Delta_r H^0$) и энтропию ($\Delta_r S^0$) реакции, считая их не зависящими от температуры;
б) конечные давления A и B в сосуде объемом 24,6 л при 300 К, в который помещено 0,05 моля вещества AB_2 .
- (200 б.) Определить pH раствора, полученного смешиванием 0,8 л 0,2М раствора NaHA и 0,2 л 0,8М раствора Na_2A . Кислота H_2A по первой ступени сильная, а $K_{a2} = 10^{-5}$.
- (200 б.) В гальваническом элементе при 25 °С протекает реакция $\text{CuSO}_4 + \text{Zn} = \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$.
Для этой реакции $\Delta_r G^0 = -212,72$ кДж.

- а) Написать полуреакции, протекающие на электродах;
б) Определить ЭДС элемента при концентрациях $C(\text{CuSO}_4) = 0,1$ моль/л и $C(\text{ZnSO}_4) = 0,01$ моль/л.
8. (200 б.) Скорости элементарной необратимой реакции $x\text{A} + y\text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$ равны $2,5 \cdot 10^{-2}$ и $2,5 \cdot 10^{-5}$ моль/л·с при $C(\text{A}) = C(\text{B}) = 0,1$ моль/л и $C(\text{A}) = C(\text{B}) = 0,01$ моль/л соответственно.
Определить молекулярность и константу скорости реакции.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ИЗ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 2003–2005 ГГ.

КР-1(2004). Сформулируйте принцип Паули. Напишите краткую электронную конфигурацию иона Ir^{4+} . Определите число нейтронов в ядре этого иона.

Решение. Согласно принципу запрета Паули, на одной спин-орбитали не может находиться более одного электрона, т. е. в атоме не может существовать двух электронов с одинаковым набором четырех квантовых чисел: n, l, m_l, m_s .

Краткая форма записи электронной конфигурации Ir^{4+} : $[\text{Xe}]4f^{14}5d^5$.

Для определения числа нейтронов в ядре необходимо выбрать один из изотопов Ir. По атомной массе, приведенной в Периодической системе, – 192,2, видно, что наиболее распространенный в природе изотоп ${}^{192}_{77}\text{Ir}$ с массовым числом 192. Порядковый номер 77 означает, что в ядре Ir как атома, так и иона Ir^{4+} содержится 77 протонов. Следовательно, число нейтронов равно $192 - 77 = 115$.

KP-1(2005). Взаимодействие α -частицы с атомом водорода приводит к образованию протона и иона He^+ . Определите изменение энергии в этой реакции.

Решение. α -частица – это ядро атома гелия, т. е. He^{2+} . Реакцию $\text{He}^{2+} + \text{H} = \text{He}^+ + \text{H}^+$ можно представить как сумму двух процессов с известными изменениями энергии:

2) $\text{He}^{2+} + e \rightarrow \text{He}^+$ E_2 – сродство к электрону ядра гелия, равное энергии электрона в одноэлектронной частице He^+ : $E = -13,6 \cdot Z^2/n^2$, где $Z = 2, n = 1$; тогда $E_2 = -54,4 \text{ эВ}$.

Изменение энергии в реакции ΔE – алгебраическая сумма E_1 и E_2 : $\Delta E = 13,6 - 54,4 = -40,8 \text{ эВ}$.

KP-1(2005). Изобразите структурные формулы и установите пространственное строение: а) молекул $\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3$ и NSF_3 (ковалентность серы равна 6); б) иона IF_2O_2^- (иод – центральный атом).

Решение. а) структурные формулы:

Геометрическое строение $\text{NH}_3 \cdot \text{BH}_3$ определим, используя представления о гибридизации АО.

Сначала рассмотрим геометрию отдельных фрагментов этой молекулы: NH_3 и BH_3 . Атом азота имеет пять валентных электронов: неподеленную пару $2s^2$ и три неспаренных $2p$ -электрона. Валентные АО атома N (одна s -АО и три p -АО) образуют четыре sp^3 -гибридные АО, направленные к вершинам тетраэдра. Три из sp^3 -ГАО заняты тремя неспаренными электронами, которые образуют химическую связь с тремя атомами H. Четвертая sp^3 -ГАО занята неподеленной парой электронов.

Атом бора имеет три валентных электрона. Электронная конфигурация возбужденного атома бора $B^* 2s^1 2p^2$. Валентные АО атома В (одна s -АО и три p -АО) образуют четыре sp^3 -гибридные АО, направленные к вершинам тетраэдра. Три из них заняты неспаренными электронами, которые образуют химическую связь с тремя атомами Н. Четвертая sp^3 -АО является вакантной.

Между фрагментами NH_3 и BH_3 образуется химическая связь по донорно-акцепторному механизму (N – донор, В – акцептор). В результате молекула $NH_3 \cdot BH_3$ представляет собой два тетраэдра, соединенные следующим образом:

Рассмотрим строение NSF_3 , используя правила Гиллеспи:

Известно, что центральный атом S имеет ковалентность 6, т. е. участвует в образовании четырех σ - и двух π -связей. Стерическое число (СЧ) определяется суммой числа σ -связывающих пар (σ -СП) и числа неподеленных пар (НП). Для S в молекуле NSF_3 СП = 4, НП = 0, СЧ = 4. Следовательно, геометрическая форма NSF_3 – тетраэдр.

Строение $IF_2O_2^-$ по Гиллеспи: СП = 4 (четыре σ -связи); НП = 1 (число неподеленных пар); СЧ = СП + НП = 5. Следовательно, пять орбиталей центрального атома иода направлены к вершинам тригональной бипирамиды. Для определения положения неподеленной пары необходимо применить дополнение Найхольма. Для этого нужно определить число взаимодействий неподеленной пары со связывающими парами под углом 90° для двух альтернативных структур:

Для структуры 1 таких взаимодействий три, а для структуры 2 таких взаимодействий – два. Следовательно, наиболее устойчивой структурой является 2. Такая структура является искаженным тетраэдром и часто называется “ходули”.

Аналогичным образом рассматриваем расположение атомов кислорода. Взаимодействие двойной связи атомов кислорода (кулоновское отталкивание) с НП больше взаимодействия одинарной связи с НП. Поэтому предпочтительнее те структуры, в которых атомы кислорода располагаются в экваториальной плоскости.

Следует отметить, что точное решение о взаимном расположении атомов F и O требует дополнительных данных.

KP-1(2005). Изобразите энергетические диаграммы МО для частиц OH, OH⁻ и O₂, O₂⁻. (Потенциалы ионизации I(H) = 13,60 эВ, I(O) = 13,62 эВ.) Объясните экспериментальный факт, что энергия связи E(OH) ≈ E(OH⁻), а E(O₂) > E(O₂⁻). Какие из этих частиц можно обнаружить методом ЭПР?

Решение: Взаимное расположение энергетических уровней АО водорода и кислорода в соответствии с потенциалами ионизации, расположение МО и заполнение их электронами (в соответствии с принципом минимальной энергии и принципом Паули) будет выглядеть следующим образом:

Число МО равно сумме АО, поэтому система МО для OH и OH⁻ состоит из четырех орбиталей: одна связывающая σ-орбиталь,

образованная $1s(\text{H})$ и $2p(\text{O})$, одна разрыхляющая σ^* -орбиталь и две несвязывающие МО, образованные двумя $2p$ -орбиталями кислорода. Кратность связи частиц OH и OH^- одинакова и равна 0,5. (Электроны на несвязывающих орбиталях вклад в связывание не вносят.) Поэтому и $E(\text{OH}) \approx E(\text{OH}^-)$.

Для O_2 и O_2^- системы МО приведены на рисунках. Исходя из этих схем, видно, как меняется кратность связи.

Кратность связи для O_2 : $(6 - 2)/2 = 2$; для O_2^- : $(6 - 3)/2 = 3/2$, поэтому и $E(\text{O}_2) > E(\text{O}_2^-)$. Частицы, имеющие неспаренные электроны, могут быть обнаружены методом ЭПР. К таким частицам относятся OH , O_2 и O_2^- .

KP-1(2005). При изотермическом сжатии идеального газа число микросостояний в расчете на одну молекулу изменилось в 2 раза. Определите, во сколько раз изменился объем газа.

РЕШЕНИЕ: При изотермическом изменении объема n молей газа изменение энтропии

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln(V_2/V_1) \quad (1)$$

Это изменение энтропии связано с изменением числа микросостояний w_2 и w_1 всей системы в конечном и начальном состояниях соответственно и может быть вычислено

$$\Delta S = k \cdot \ln(w_2/w_1).$$

Для системы из n молей газа изменение энтропии, приходящееся на одну молекулу, равно $\Delta S/n \cdot N_A$. Это изменение энтропии связано с изменением числа микросостояний одной частицы ω следующим образом:

$\Delta S/n \cdot N_A = k \cdot \ln \omega_2/\omega_1$; $\Delta S = n \cdot N_A \cdot k \cdot \ln \omega_2/\omega_1$; Поскольку $N_A \cdot k = R$, получим

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln \omega_2/\omega_1. \quad (2)$$

Приравнявая правые части уравнений (1) и (2), получаем: $n \cdot R \cdot \ln V_2/V_1 = n \cdot R \cdot \ln \omega_2/\omega_1$.

Отсюда следует, что $V_2/V_1 = \omega_2/\omega_1 = 0,5$.

КР-1(2004). Для изохорного нагревания n молей идеального одноатомного газа от 300 до 400 К было затрачено 24, 93 кДж теплоты. Определить n и изменение в этом процессе энтальпии ΔH , внутренней энергии ΔU и энтропии ΔS .

РЕШЕНИЕ: При изохорном ($V = \text{const}$) нагревании n молей газа от температуры T_1 до температуры T_2 количество теплоты равно: $Q_v = n \cdot C_v \cdot (T_2 - T_1)$, где C_v – молярная изохорная теплоемкость газа dU/dT , которая рассчитывается в соответствии с распределением внутренней энергии по степеням свободы движений. Для одноатомного газа возможно только поступательное движение с распределением внутренней энергии по $(1/2)RT$ на каждую степень свободы, т. е. $(3/2)RT$. Поэтому $C_v = (3/2)R$ Дж/моль·К.

Тогда $n = Q_v/[C_v \cdot (T_2 - T_1)] = 24930 / ((3/2) \cdot 8,31 \cdot 100) = 20$ моль. Изменение энтальпии в изохорном нагревании $\Delta H = n \cdot C_p \cdot (T_2 - T_1)$, где C_p – молярная изобарная теплоемкость, которая равна $C_v + R$, т. е. $(5/2)R$. Тогда $\Delta H = 20 \cdot (5/2) \cdot 8,31 \cdot 100 = 41550$ Дж.

ΔU – изменение внутренней энергии в изохорном процессе. Это же – теплота нагревания Q_v (следствие первого начала термодинамики). Поэтому $\Delta U = 24,93$ кДж.

ΔS – изменение энтропии в изохорном процессе нагревания n молей равно $\Delta S = n \cdot C_V \cdot R \cdot \ln(T_2/T_1)$, т. е.

$$\Delta S = 20 \cdot (3/2) \cdot 8,31 \cdot \ln(400/300) = 71,72 \text{ Дж/К.}$$

ЭКЗАМЕН(2003). Для углеводорода C_nH_{2n} при полном возбуждении всех степеней свободы движений молярная теплоемкость при постоянном давлении равна $16R$. Определите природу углеводорода и качественно изобразите ПМР-спектр.

РЕШЕНИЕ: Для определения природы углеводорода необходимо определить его состав, т. е. n . Изохорная теплоемкость $C_V = C_p - R = 15R$ зависит от числа возбужденных степеней свободы движений. Для углеводорода C_nH_{2n} общее число степеней свободы равно $3 \cdot 3n = 9n$. Из них – 3 поступательные, 3 вращательные (молекула нелинейна), остальные степени свободы ($9n - 6$) – колебательные, вклад которых в общую теплоемкость составляет: $15R - 3/2R - 3/2R = 12R$. Исходя из закона о равномерном распределении внутренней энергии по степеням свободы – по РТ на каждую колебательную степень свободы, – можно сделать вывод, что в молекуле углеводорода 12 колебательных степеней свободы. Таким образом, $9n - 6 = 12$, откуда $n = 2$. Следовательно, углеводород C_2H_4 – этилен.

Спектр ПМР состоит из одной линии, так как все протоны в молекуле этилена эквивалентны.

КР-1(2005). ПМР-спектр кислородсодержащего органического соединения C_nH_mO , имеющего молекулярную массу 46, состоит из одной линии. Установите структурную формулу этого соединения.

РЕШЕНИЕ: Сначала необходимо установить состав соединения. Из молярной массы вычитаем массу атомарного

кислорода $46 - 16 = 30$. Очевидно, что $n = 1$ не подходит. Для $n = 2$ состав C_2H_6O . Это может быть этанол или диметиловый эфир. Этанол CH_3CH_2OH должен иметь три линии в ПМР-спектре (три неэквивалентные группы протонов) с отношением интенсивностей $3 : 2 : 1$.

По условию задачи в ПМР-спектре соединения наблюдается одна линия, из чего следует эквивалентность всех протонов. Такой спектр возможен для диметилового эфира CH_3-O-CH_3 .

КР-2 (2004). Для реакции $PCl_5(г.) = PCl_3(г.) + Cl_2(г.)$ известна константа равновесия $K_p = 1,8$ при 520 К . Определите: а) константу равновесия K_c ; б) общее давление, при котором равновесное значение степени превращения PCl_5 составит 50% , если первоначально в системе ($V = \text{const}$) присутствовал только PCl_5 .

РЕШЕНИЕ: а) Используя взаимосвязь K_p и K_c , найдем K_c :

$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$, где Δn – изменение числа молей компонентов в газовой фазе для стехиометрического уравнения реакции. Для реакции, приведенной в условии задачи, $\Delta n = 2 - 1 = 1$;
 $R = 0,082\text{ л}\cdot\text{атм}/\text{моль}\cdot\text{К}$; $T = 520\text{ К}$.

$$K_c = 1,8(RT)^{-\Delta n} = 1,8 \cdot (0,082 \cdot 520)^{-1} = 0,0422.$$

б) Давление в системе (при $V = \text{const}$) изменяется пропорционально стехиометрическому изменению числа молей n , так как $P = (n/V)RT$.

Если начальное давление PCl_5 равно p^0 , то при 50% -ном превращении PCl_5 его равновесное давление станет $0,5p^0$, а равновесные давления ($\bar{p}$) продуктов реакции по $0,5p^0$. Подставив равновесные давления в выражение константы равновесия, получим:

$$K_p = (\bar{p}_{PCl_3} \cdot \bar{p}_{Cl_2}) / \bar{p}_{PCl_5} = (0,5p^0 \cdot 0,5p^0) / 0,5p^0 = 1,8$$

откуда $p^0 = 3,6\text{ атм}$. Суммарное равновесное давление:
 $1,5p^0 = 5,4\text{ атм}$.

KP-2 (2003). При 298 К величина осмотического давления (π) 0,1 М раствора кислоты *HA* отличается на 25 % от величины π 0,1 М раствора *HCl*. Определите: а) *pH* каждого из этих растворов; б) концентрации всех частиц и *pH* раствора, полученного смешиванием равных объемов исходных растворов кислот.

РЕШЕНИЕ: а) Из условий задачи следует учесть, что *HCl* – сильная кислота, т. е. $[H^+] = 0,1$ моль/л и $pH = 1$. Осмотическое давление 0,1 М *HCl* находится из уравнения $\pi = i \cdot C \cdot R \cdot T$, где i – изотонический коэффициент. Для *HCl* $i = 2$, и $\pi(HCl) = 2 \cdot 0,1 \cdot 0,082 \cdot 298 = 4,89$ атм. Осмотическое давление *HA* не может быть больше осмотического давления *HCl*, так как при одинаковых концентрациях кислот значение i максимально для сильной кислоты *HCl*. Следовательно, $\pi(HA) = 0,75 \cdot \pi(HCl) = 0,75 \cdot 4,89 = 3,66$ атм.

Далее можно найти $i(HA) = \pi(HA) / (C(HA) \cdot R \cdot T)$. $i = 3,66 / (0,1 \cdot 0,082 \cdot 298) = 1,5$. Учитывая взаимосвязь i и степени диссоциации α , $i = 1 + \alpha(m - 1)$, где m – число частиц, на которые распадается одна молекула электролита, получаем $1,5 = 1 + \alpha(2 - 1)$, откуда находим $\alpha = 0,1$. Далее находим: $[H^+] = \alpha \cdot C^0 = 0,1 \cdot 0,1 = 0,01$ моль/л и $pH = 2$.

Равновесные концентрации (*) всех частиц в 0,1 М растворе *HA*: $[H^+] = 0,01$; $[A^-] = [H^+] = 0,01$; $[HA] = C^0 - [A^-] = 0,1 - 0,01 = 9 \cdot 10^{-2}$ моль/л позволяют вычислить $K_a(HA) = [H^+] \cdot [A^-] / [HA] = (0,01 \cdot 0,01) / 0,09 = 1,11 \cdot 10^{-3}$.

б) При смешивании равных объемов кислот уменьшаются в 2 раза начальные концентрации *HCl* и *HA*: $C^0(HCl) = 0,05$; $C^0(HA) = 0,05$ моль/л;

Необходимо учесть, что сильная кислота *HCl* смещает равновесие диссоциации $HA = H^+ + A^-$ в сторону реагентов. Обозначим $[A^-] = x$, тогда $[H^+] = 0,05 + x$, $[HA] = 0,05 - x$. Подставив эти значения в выражение $K_a(HA) = [H^+] \cdot [A^-] / [HA] =$

* Равновесные концентрации частиц в растворе, например концентрация H^+ , обозначаются $\bar{C}(H^+)$ или $[H^+]$.

$= (0,05 + x)x / (0,05 - x) = 1,11 \cdot 10^{-3}$ и решая квадратное уравнение, находим $x = 0,107 \cdot 10^{-2}$ моль/л.

Тогда $[A^-] = 0,107 \cdot 10^{-2}$; $[H^+] = 5,107 \cdot 10^{-2}$; $[HA] = 4,893 \cdot 10^{-2}$ моль/л. $[Cl^-] = 0,05$ моль/л. $pH = 1,29$.

Проверка решения: $C^0(HA) = [HA] + [A^-] = 0,107 \cdot 10^{-2} + 4,893 \cdot 10^{-2} = 0,05$ моль/л.

Или: $K_a = (0,05 + 0,107 \cdot 10^{-2}) \cdot 0,107 \cdot 10^{-2} / (0,05 - 0,107 \cdot 10^{-2}) = 1,11 \cdot 10^{-3}$.

КР-2 (2004). При разложении 1 моля твердого вещества A образуется x молей газообразного продукта B : $A(тв) = x B(г)$. Для этой реакции при 500 и 600 К равновесные давления $B(г)$ равны 0,5 и 1 атм соответственно; $\Delta_r H^0 = 34, 56$ кДж. (Принять, что $\Delta_r H^0$ не зависит от температуры.) Определите x .

РЕШЕНИЕ: Используем уравнение температурной зависимости константы равновесия реакции:

$$\ln(K_{p,600}/K_{p,500}) = \Delta_r H^0 / R \cdot (1/500 - 1/600).$$

Подставив в это уравнение выражение K_p через равновесные парциальные давления ($K_p = \bar{p}^x_B$), найдем x :

$$\ln(1/0,5)^x = 34560 \cdot 100 / 8,31 \cdot 500 \cdot 600; \quad x \ln 2 = 1,386; \quad x = 2.$$

КР-2 (2005). Для реакции $A(тв) = B(г) + 2C(г)$ при температуре T известны значения $K_p = 1$ и $K_c = 1,45 \cdot 10^{-5}$. Определите при этой температуре: а) равновесный состав в молях, если в сосуд объемом $V = 16,4$ л первоначально поместили 2 моля A , 0,1 моля B и 0,8 моля C ; б) величину химической переменной ξ после установления равновесия; в) общее равновесное давление в системе.

РЕШЕНИЕ: а) Для того чтобы определить равновесный состав, необходимо узнать, в каком направлении пойдет процесс. Используя уравнение изотермы химической реакции $\Delta G = RT \ln(\Pi/K)$ (или $dG/d\xi = RT \ln(\Pi/K)$), знак ΔG можно определить, сравнивая значения константы равновесия K_c и произведения реакции Π_c :

$$K_c = 1,45 \cdot 10^{-5} \quad \text{и} \quad \Pi_c = C(B) \cdot C^2(C) = 0,1/16,4 \cdot (0,8/16,4)^2 = 1,45 \cdot 10^{-5}.$$

В данных условиях $K_c = \Pi_c$ и $\Delta G = 0$, следовательно, система находится в состоянии равновесия и $n(A) = 2$ моля; $n(B) = 0,1$ моля; $n(C) = 0,8$ моля.

б) Химическая переменная для системы, исходное состояние которой – равновесное, равна нулю ($\xi = 0$).

в) Общее равновесное давление можно найти, если выразить равновесные парциальные давления через общее равновесное давление $\bar{P}_{\text{общ}}$ и равновесные молярные доли компонентов x :

$$\bar{p}(B) = x_B \cdot \bar{P}_{\text{общ}} = 0,1/(0,1 + 0,8) \cdot \bar{P}_{\text{общ}} \quad \text{и} \quad \bar{p}(C) = x_C \cdot \bar{P}_{\text{общ}} = 0,8/(0,1 + 0,8) \cdot \bar{P}_{\text{общ}}.$$

Подставив эти значения в выражение:

$$K_p = (1/9) \cdot \bar{P}_{\text{общ}} \cdot (8/9)^2 \cdot \bar{P}_{\text{общ}}^2 = 1, \quad \text{находим} \quad \bar{P}_{\text{общ}} = 2,25 \text{ атм.}$$

Можно эту задачу решить иначе.

Из взаимосвязи K_p и K_c можно найти температуру: $K_p/K_c = (RT)^3 = 1/1,45 \cdot 10^{-5}$; $0,082T = (10^5/1,45)^{1/3}$, $T = 500$ К.

Далее необходимо выяснить, в каком направлении пойдет процесс, т. е. определить знак ΔG в уравнении изотермы химической реакции. Для этого нужно сравнить величины константы равновесия K_p и Π_p или K_c и Π_c (см. выше). Вычислим начальные парциальные давления $p^0(B)$ и $p^0(C)$:

$$p^0(B) = (0,1 \cdot 0,082 \cdot 500)/16,4 = 0,25 \text{ атм.}$$

$$p^0(C) = (2 \cdot 0,082 \cdot 500)/16,4 = 2,0 \text{ атм.}$$

$\Pi_p = p^0(B) p^0(C)^2 = 0,25 \cdot 2^2 = 1$, т. е. $\Pi_p = K_p$, следовательно, $\Delta G = 0$, что соответствует состоянию равновесия.

а) равновесный состав: 2 моля A ; 0,1 моля B ; 0,8 моля C ;

б) $\xi = 0$; в) $\bar{P}_{\text{общ}} = 0,25 + 2 = 2,25$ атм.

КР-3 (2004). В сосуд емкостью 0,1 л поместили по 1 молю AB_3 , AB и B . После установления равновесия: $AB_3(\text{тв}) = AB(\text{тв}) + 2B(\text{г})$ при $T = 300$ К $\xi = -0,45$. Определите: а) равновесный состав; б) K_c и K_p ; в) $\Delta_r G_{300}$ и $\Delta_r G^0_{300}$.

РЕШЕНИЕ: а) По определению $\xi = (n_i - n_i^0)/\nu_i$, где n_i^0 – начальные количества компонентов, n_i – равновесные количества компонентов, ν_i – стехиометрические коэффициенты компонентов, если стехиометрическое уравнение записано как $\sum \nu_i Y_i = 0$. Это позволяет вычислить равновесные количества всех компонентов.

$$\xi(AB_3) = (n(AB_3) - n^0(AB_3))/-1 = -0,45; n(AB_3) = 1,45 \text{ моля};$$

$$\xi(AB) = (n(AB) - n^0(AB))/1 = -0,45; n(AB) = 0,55 \text{ моля};$$

$$\xi(B) = (n(B) - n^0(B))/2 = -0,4; n(B) = 0,10 \text{ моля}.$$

б) Для вычисления значений K_c и K_p необходимо знать соответственно равновесные концентрации и парциальные давления компонентов в газовой фазе.

$$[B] = 0,1/0,1 = 1 \text{ моль/л}; K_c = [B]^2 = 1;$$

$$\bar{p}_B = 0,1/0,1 \cdot 0,082 \cdot 300 = 24,6 \text{ атм}; K_p = \bar{p}_B^2 = 605.$$

$$\text{в) } \Delta_r G_{300}^0 = -RT \ln K_p = -8,31 \cdot 300 \cdot \ln 605 = -15969 \text{ Дж};$$

$$p_B^0 = 1/0,1 \cdot 0,082 \cdot 300 = 246 \text{ атм}; P_p = (p_B^0)^2 = 60500;$$

$$\Delta_r G_{300} = RT \cdot \ln(P_p/K_p) = 8,31 \cdot 300 \cdot \ln 100 = 11480,7 \text{ Дж}.$$

КР-2 (2003). Для реакции $AB_2(\text{тв}) = A(\text{тв}) + 2B(\text{г})$ при температуре T известно $\Delta_r G_T^0 = -RT \ln(0,25)$. Найдите:

а) давление в системе после установления равновесия, если в предварительно вакуумированный сосуд объемом 1 л поместили по 1 молю AB_2 и A ; б) как влияет на равновесие уменьшение: 1) давления; 2) температуры? Ответ обосновать.

РЕШЕНИЕ: а) Из выражения $\Delta_r G_T^0 = -RT \ln K_p$ и условия задачи следует, что $K_p = \bar{p}_B^2 = 0,25$, т. е. равновесное давление B

$\bar{p}_B = (0,25)^{1/2} = 0,5 \text{ атм}$. Из уравнения Менделеева–Клапейрона $P_B = (n_B/V) \cdot 0,082 \cdot T$ можно оценить количество молей образовавшегося $B(\text{г})$ при $T = 298 \text{ К}$ ($n = 0,02 \text{ моля}$) или при $T = 1000 \text{ К}$ ($n = 0,06 \text{ моля}$), что позволяет сделать вывод, что при любой разумной температуре твердая фаза AB_2 полностью не расходуется и найденное равновесное давление может быть достигнуто.

б) Для ответа на этот вопрос можно использовать принцип Ле-Шателье.

1) Уменьшение давления смещает равновесие в сторону продуктов, так как в этом направлении происходит увеличение давления в системе.

2) Чтобы оценить влияние температуры на равновесие, необходимо определить знак $\Delta_r H^0_T$. Из условия задачи $\Delta_r G^0_T = -RT \ln(0,25)$ следует, что $\Delta_r G^0_T > 0$. Очевидно, что и $\Delta_r S^0_T > 0$. Поскольку $\Delta_r G^0_T = \Delta_r H^0_T - T \cdot \Delta_r S^0_T$, то $\Delta_r G^0_T$ может быть положительна только в случае, если $\Delta_r H^0_T > 0$. Для эндотермической реакции уменьшение температуры смещает равновесие в сторону реагентов.

КР-2 (2005). В 1 л 0,010 М раствора $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ добавили 0,021 моля КОН. Выпал осадок $\text{Ni}(\text{OH})_2$ ($K_L = 1,2 \cdot 10^{-16}$). Определите:

а) pH конечного раствора;

б) $[\text{Ni}^{2+}]$;

в) осмотическое давление раствора при 298 К.

РЕШЕНИЕ: а) $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + 2 \text{KOH} = \text{Ni}(\text{OH})_2(\text{тв}) + 2 \text{KNO}_3$,
или (так как $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ и KOH – сильные электролиты):

Учитывая стехиометрию взаимодействия, для осаждения 0,010 молей Ni^{2+} требуется 0,020 молей OH^- . В 1 л раствора остается избыток 0,001 моля KOH , который и определяет pH раствора:

$$[\text{OH}^-] \approx 10^{-3} \text{ моль/л}, \quad pH = 11.$$

б) Концентрация Ni^{2+} определяется величиной константы равновесия: $\text{Ni}(\text{OH})_2(\text{тв}) = \text{Ni}^{2+} + 2 \text{OH}^-$; $K_L = [\text{Ni}^{2+}][\text{OH}^-]^2$;

$$[\text{Ni}^{2+}] = 1,2 \cdot 10^{-16} / (10^{-3})^2 = 1,2 \cdot 10^{-10} \text{ моль/л}.$$

в) Чтобы найти π , необходимо рассчитать концентрацию всех ионов в растворе:

$$C_{\text{общ.}} = [\text{K}^+] + [\text{NO}_3^-] + [\text{OH}^-] = 0,021 + 0,020 + 0,001 = 0,042 \text{ моль/л}.$$

$$\pi = C_{\text{общ.}} RT = 0,042 \cdot 0,082 \cdot 298 = 1,026 \text{ атм}.$$

КР-3 (2004). Гальванический элемент состоит из двух электродов: 1) Fe-пластина ($m = 0,56$ г), погруженная в 0,1 л 0,05 М раствора FeSO_4 ; 2) Zn-пластина ($m = 0,98$ г) в 0,1 л 0,01 М раствора ZnSO_4 .

а) напишите полуреакции, протекающие на электродах;

б) рассчитайте ЭДС элемента;

в) определите $[\text{Fe}^{2+}]$, $[\text{Zn}^{2+}]$ и массу Fe- и Zn-пластин после достижения значения ЭДС = 0.

$T = 298$ К; $E^0_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,440$ В; $E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = -0,763$ В; $M(\text{Fe}) = 56,0$ г/моль; $M(\text{Zn}) = 65,4$ г/моль.

РЕШЕНИЕ: а) Сначала рассчитаем значения электродных потенциалов железного и цинкового электродов:

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = E^0_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} + (0,059/2) \lg[\text{Fe}^{2+}] = -0,440 + (0,059/2) \lg(5 \cdot 10^{-2}) = -0,478 \text{ В.}$$

$$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = E^0_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} + (0,059/2) \lg[\text{Zn}^{2+}] = -0,763 + (0,059/2) \cdot \lg(10^{-2}) = -0,822 \text{ В.}$$

Поскольку $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}$ больше, чем $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}$, железный электрод будет катодом, на котором идет восстановление:

Цинковый электрод будет анодом, на котором идет окисление:

б) В элементе будет протекать реакция:

Значение ЭДС элемента $\Delta E = -0,478 - (-0,822) = 0,344$ В. Необходимо помнить, что самопроизвольные реакции протекают в направлении уменьшения энергии Гиббса, т. е. $\Delta_r G < 0$ или $\Delta E > 0$, так как $\Delta_r G = -z \cdot F \cdot \Delta E$.

в) $\Delta E = 0$ характеризует состояние равновесия. Для определения равновесных концентраций нужно знать константу равновесия K_c , которую можно вычислить из электрохимических данных: при 298 К $\Delta E^0 = (0,059/2) \lg K_c$.

Стандартная ЭДС рассматриваемого элемента $\Delta E^0 = -0,440 + 0,763 = 0,323$ В; и $K_c = 8,90 \cdot 10^{10}$.

Поскольку K_c велика, реакция будет идти вправо до тех пор, пока один из реагентов (Fe^{2+} или Zn), находящийся в недостатке, не израсходуется практически полностью. В 0,1 л 0,05 М FeSO_4 содержится 0,005 моля Fe^{2+} ; количество металлического цинка равно $0,98 \text{ г} / 65,4 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1} = 0,015$ моля, следовательно, реакция будет идти до практически полного исчезновения Fe^{2+} в растворе. При этом растворится 0,005 моля цинка и конечные концентрации компонентов в растворе будут: $[\text{Fe}^{2+}] \approx 0$; $[\text{Zn}^{2+}] = 0,01 + 0,005/0,1 = 0,06$ моль/л. Массы металлических пластин будут следующие: $m(\text{Fe}) = 0,56 \text{ г} + 0,005 \text{ моль} \cdot 56 \text{ г/моль} = 0,84 \text{ г}$; $m(\text{Zn}) = 0,98 \text{ г} - 0,005 \text{ моль} \cdot 65,4 \text{ г/моль} = 0,65 \text{ г}$.

КР-3 (2003). Для обратимой элементарной реакции

($k_1 = 0,4 \text{ мин}^{-1}$) и обратной ($k_{-1} = 1,0 \text{ л/моль} \cdot \text{мин}$) реакций. Определите скорости прямой и обратной реакций в равновесии, если начальные концентрации компонентов: $C^0(A) = 0,1 \text{ моль/л}$, $C^0(B) = 0$.

РЕШЕНИЕ: Для элементарных реакций отношение констант скорости прямой и обратной реакций позволяет вычислить константу равновесия $K_c = k_1/k_{-1} = 0,4$.

Обозначим концентрацию прореагировавшего A через x ; тогда $[A] = 0,1 - x$; $[B] = 2x$. Подставив их в выражение $K_c = [B]^2/[A] = (2x)^2/(0,1 - x) = 0,4$, и, решая квадратное уравнение, находим $x = 0,062 \text{ моль/л}$; тогда $[B] = 0,124$; $[A] = 0,038 \text{ моль/л}$.

Скорости реакций в прямом (v_+) и обратном (v_-) направлениях в равновесии равны друг другу.

$$v_+ = k_1[A] = 0,4 \cdot 0,038 = 0,015 \text{ моль/л} \cdot \text{мин.}$$

Для проверки можно определить и v_- :

$$v_- = k_{-1}[B]^2 = 1,0 \cdot (0,124)^2 = 0,015 \text{ моль/л} \cdot \text{мин.}$$

КР-4 (1999). Вещество A превращается в вещество B в две стадии:

1) $A \xrightarrow{k_1} P$ 2) $P \xrightarrow{k_2} B$, где P – очень реакционноспособное промежуточное соединение. Найдите энергию активации для первой стадии, если известно, что при одинаковой концентрации A скорость образования вещества B при 27°C в два раза меньше, чем при 37°C . (Концентрацию P считать квазистационарной.)

РЕШЕНИЕ. Условие квазистационарности по P записывается для данного механизма реакции следующим образом:

$$\frac{dC(P)}{dt} = k_1C(A) - k_2C(P) = 0, \text{ откуда следует, что скорость}$$

образования вещества B : $v_B = k_2C(P)$ равна скорости первой стадии реакции:

$$v_A = k_1C(A).$$

Так как $\frac{v_{310}}{v_{300}} = 2$, то $\frac{k_0 \cdot e^{-E_a/310R} \cdot C(A)}{k_0 \cdot e^{-E_a/300R} \cdot C(A)} = 2$. Решая это

уравнение, находим E_a для первой стадии реакции:

$$E_a = \frac{\ln 2 \cdot 8,31 \cdot 310 \cdot 300}{10} = 53560 \text{ Дж/моль.}$$